

Chirurgische Händedesinfektion

Home

Standardeinreibemethode für die chirurgische Händedesinfektion
gem. EN 12791

- Bei optisch sauberen Händen ist eine Händewaschung vor der eigentlichen chirurgischen Händedesinfektion laut RKI nicht erforderlich.
- Bei Dienstbeginn, spätestens vor Anlegen der OP-Kleidung sollten die Hände gewaschen werden, da alkoholische Händedesinfektionsmittel nicht sporizid wirken.



1. Schritt

Hände mit einer milden
Waschlotion gründlich
waschen.
Danach Hände
sorgfältig abspülen.



2. Schritt

Hände mit einem
Einmalhandtuch
oder sterilem Tuch
abtrocknen.




3. Schritt

Händedesinfektionsmittel
aus dem Spender in die
trockene, hohle Hand
geben.
Dabei Spender mit dem
Ellenbogen betätigen.



4. Schritt

Hände und Unterarme
bis zu den Ellenbogen
von 1,5 - 3 Minuten
(je nach Präparat)
einreiben.
Während der
gesamten Einwirkzeit
benetzt halten.



5. Schritt

Hände gezielt
desinfizieren. Dabei die
Standard-Einreibeme-
thode zur hygienischen
Händedesinfektion
befolgen.



6. Schritt

Hände über Ellenbogen-
niveau halten.
Hände müssen vor dem
Anlegen der
OP-Handschuhe
lufttrocken sein.